

## **Pakendi infoleht: teave patsiendile**

### **Oftan Akvakol 5 mg/ml silmatilgad, lahus klooramfenikool**

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Oftan Akvakol ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Oftan Akvakol'i kasutamist
3. Kuidas Oftan Akvakol'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Oftan Akvakol'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Oftan Akvakol ja milleks seda kasutatakse**

Oftan Akvakol silmatilgad sisaldavad klooramfenikooli. See ennetab silmapõletikke põhjustavate bakterite kasvu.

Oftan Akvakol'i kasutatakse bakteriaalsete silmapõletike raviks. Seda võib kasutada ka põletike ennetamiseks seoses silmakahjustuste ja operatsioonidega.

Seda ravimit võivad kasutada nii täiskasvanud kui lapsed.

#### **2. Mida on vaja teada enne Oftan Akvakol'i kasutamist**

##### **Oftan Akvakol'i ei tohi kasutada**

- kui olete klooramfenikooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on isiklikus või perekonna anamneesis teadaolev vere düskraasia, näiteks aplastiline aneemia.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Oftan Akvakol'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

##### **Muud ravimid ja Oftan Akvakol**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te peate manustama samasse silma mitut ravimit, oodake vähemalt 5 minutit enne teise ravimi manustamist. Silmasalv tuleb alati manustada viimasena.

Oftan Akvakol'i ei tohi kasutada samaaegselt ravimitega, mis võivad pärssida luuüdi funktsiooni.

##### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal peab klooramfenikooli kasutama ettevaatusega.

#### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Pärast silmatilkade kasutamist, võib teil tekkida ajutine hägune nägemine. Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid kuni teie nägemine on selge. Kui te kahtlete, rääkige oma arsti või apteekriga.

#### **Oftan Akvakol sisaldab bensalkooniumkloriidi**

Ravim sisaldab ligikaudu 0,002 mg bensalkooniumkloriidi ühes tilgas lahuses, mis vastab 0,04 mg/ml. Bensalkooniumkloriid võib põhjustada silmaärritust, eriti kui teil on kuivsilmsus või sarvkesta (silma eesmine läbipaistev osa) kahjustus. Kui tunnete ravimi kasutamise järgselt silmas ebamugavust, kipitust või valu, konsulteerige arstiga.

#### **Kontaktläätsed**

Bensalkooniumkloriid võib absorbeeruda pehmetesse kontaktläätsedesse ja muuta nende värvust. Eemaldage kontaktläätsed enne ravimi manustamist ja pange tagasi 15 minutit pärast manustamist. Kontaktläätsede kandmist põletikulises silmas tuleb vältida, kuna infektsiooni paranemine võib kesta kauem või võib halveneda.

### **3. Kuidas Oftan Akvakol'i kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Alguses on soovitatav annus üks tilk 6...8 korda päevas; kui sümptomid vähenevad, võib annust järkjärgult vähendada.

#### **Enne silmatilkade manustamist:**


- peske käed,
- valige tilkade tilgutamiseks kõige mugavam asend (nt istudes, seliliasendis, seistes peegli ees)

#### **Manustamine:**

1. Avage pudel. Pudeli sisu saastumisest hoidumiseks ärge laske pudeli otsikul puutuda kokku mingite pindadega.
2. Kallutage pea kuklasse ja asetage pudel kohakuti silmaga.



3. Tõmmake alumist silmalaugu alla, vaadake üles ja pigistage pudelit kuni tilk kukub silma.



4. Sulgege silm ja vajutage nimetissõrmega silma sisemisele nurgale umbes minuti jooksul. Sellega hoiate ära silmatilkade valgumise ninaneelu. Sulgege pudel.



Kui te kasutate nii silmatilkasid kui silmasalvi, manustage salvi viimasena. Kui te peate manustama samasse silma mitut ravimit, oodake vähemalt 5 minutit enne teise ravimi manustamist.

#### **Kasutamine lastel**

Lapsed võivad seda ravimit kasutada samamoodi kui täiskasvanud.

#### *Lapsed*

Annuse kohandamine võib olla vajalik vastündinutel, kuna ebaküpse metabolismi tõttu on süsteemne eritumine vähenenud ning esineb risk annusest sõltuvate kõrvaltoimete tekkeks. Maksimaalne ravikestus on 10...14 päeva.

#### **Kui te kasutate Oftan Akvakol'i rohkem, kui ette nähtud**

Kui te manustate tilkasid liiga palju, voolab liigne kogus välja ning ei põhjusta eriti mingeid sümptomeid.

#### **Kui te unustate Oftan Akvakol'i kasutada**

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Oftan Akvakol silmatilgad on hästi talutavad.

#### **Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):**

- allergilised reaktsioonid
- mööduv silmaärritus nagu sügelus, põletustunne, torkiv tunne või konjunktivaalne hüperemia, superinfektsioonid.

#### **Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):**

- perifeerne neuropaatia
- nägemisnärv neuriiit.

**Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):**

- Luuüdi depressiooni kaks vormi: 1. annusest sõltuv pöörduv luuüdi depressioon, millega kaasnevad luuüdi morfoloogilised muutused; 2. raske pöördumatu aplastiline aneemia (annusest mittesõltuv)
- Allergiline konjunktiviit.

**Teised kõrvaltoimed:**

Teised kõrvaltoimed on esinenud väiksel arvul inimestel, kuid nende sagedus on teadmata:

- anafülaktilised reaktsioonid;
- angioneurootiline turse, urtikaaria, vesikulaarne ja makulopapulaarne dermatiit.

**Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

**5. Kuidas Oftan Akvakol'i säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 28 päeva. Avatud pudel hoida toatemperatuuril (kuni 25°C). Hoida pudel tihedalt suletuna.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

**6. Pakendi sisu ja muu teave****Mida Oftan Akvakol sisaldab**

- Toimeaine on klooramfenikool. 1 ml lahust sisaldab 5 mg klooramfenikooli.
- Abiained on bensalkooniumkloriid (säilitusaine), boorhape, booraks, polüsorbaat 80, süstevesi.

**Kuidas Oftan Akvakol välja näeb ja pakendi sisu**

Selge ja värvitu kuni kergelt kollakas lahus. Valge LDPE 10 ml pudel HDPE korgiga.

**Müügiloa hoidja**

Santen Oy  
Niittyhaankatu 20  
33720 Tampere  
Soome

**Tootja**

Santen Oy  
Kelloportinkatu 1  
33100 Tampere  
Soome

**Infoleht on viimati uuendatud novembris 2020.**

**Muud teabeallikad**

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: [www.raviamet.ee](http://www.raviamet.ee).