

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Käsimüügiravim*

Lamisil DermGel, 10 mg/g geel terbinafiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 2 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Lamisil DermGel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Lamisil DermGel'i kasutamist
3. Kuidas Lamisil DermGel'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Lamisil DermGel'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Lamisil Dermgel ja milleks seda kasutatakse

Lamisil DermGel on seenevastase toimega geel, mis hävitab nahahaigust põhjustavad seened. Lamisil DermGel'i kasutatakse jala seenhaiguse raviks (*tinea pedis*).

Lamisil DermGel'i toime kestab kaua. Kui geeli kasutada vastavalt ettekirjutustele, täheldatakse ainult 10%-l jalanaha seenhaigusega patsientidest haiguse taaspuhkemist.

Ravim on näidustatud täiskasvanutele ja noorukitele alates 12 aasta vanusest.

Kuidas Lamisil Dermgel toimib

Jalanaha seenhaigus esineb ainult labajalgadel (tavaliselt mõlemal, kuid mitte alati), sageli varvaste vahel. Haigus võib esineda jalaseljal, kandadel või teistes labajala piirkondades. Haigussümptomiteks on naha lõhenemine või ketendus, kuid tekkida võib ka kerge turse, vesivillid või leemendavad haavandid.

Kui teil aga esineb küünte seenhaigus (seen küünes või selle all), millele on iseloomulik küünte värvuse ja struktuuri muutus (paksud, kihistunud küüned), tuleb pöörduda arsti poole, kuna Lamisil DermGel ei sobi seda tüüpi seenhaiguse raviks.

2. Mida on vaja teada enne Lamisil Dermgel'i kasutamist

Lamisil Dermgel'i ei tohi kasutada

- kui olete terbinafiini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lamisil Dermgel'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Kreemi kasutada ainult välispidiselt.

* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

- Mitte kasutada suus või alla neelata.
- Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Imik ei tohi sattuda kontakti ema ravitava nahapiirkonnaga, kaasa arvatud ema rinnad.
- Vältida kontakti näo, silmade või kahjustatud nahaga (märgatavalt turses nahapiirkonnad), millele alkohol võib olla ärritava toimega (nt pärast päikese käes viibimist või raskekujulise naha ketenduse korral). Kui geel peaks kogemata silma sattuma, pühkige see ära ja loputage silma hoolikalt puhta veega. Kui ebamugavustunne püsib, pöörduge arsti poole.
- Ravim ei sobi küüne seennakkuse korral. Kui teil on küünte seeninfektsioon (seen on küüne all), esineb küüne värvuse ja struktuuri muutusi (paksenenud, helbeline), pöörduge arsti poole.
- Arvestage võimalusega, et kaasuv seennakkus võib ägeneda.

Lapsed ja noorukid

Ebapiisavate ohutus- ja efektiivsusandmete tõttu ei ole Lamisil Dermgel'i kasutamine alla 12-aastastel lastel soovitatav.

Muud ravimid ja Lamisil Dermgel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Ärge kasutage samaaegselt teisi ravimeid kahjustatud nahapiirkonnal.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Mitte kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui see on selgelt näidustatud.

Ärge kasutage Lamisil Dermgel'i rinnaga toitmise ajal. Toimeaine võib erituda rinnapiima.

Imik ei tohi sattuda kontakti ema ravitava nahapiirkonnaga, kaasa arvatud ema rinnad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lamisil DermGel ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitlemise võimet.

Oluline teave mõningate Lamisil DermGel'i koostisainete suhtes

Lamisil Dermgel sisaldab butüülhüdrosütolueeni, mis võib põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti) või silmade ja limaskestade ärritust.

Ravim sisaldab 5 mg bensüülalkoholi ühes grammis geelis. Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone ja kerget paikset ärritust.

Ravim sisaldab 100 mg alkoholi (etanool) ühes grammis geelis. See võib põhjustada kahjustatud nahal põletustunnet.

3. Kuidas Lamisil Dermgel'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline on kasutada Lamisil Dermgel'i õigesti. Järgige juhiseid.

Kui teil aga esineb küünte seenhaigus (seen küünes või selle all), millele on iseloomulik küünte värvuse ja struktuuri muutus (paksud, kihistunud küüned), tuleb pöörduda arsti poole, kuna Lamisil DermGel ei sobi seda tüüpi seenhaiguste raviks. Küüne seenhaiguse raviks tuleb kasutada Lamisil tablette, mis on saadaval vaid retseptiga.

Kasutamishüüanded:

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:

- Peske ja kuivatage käed ja ravitav nahapiirkond.

- Avage tuub, esmakordsel kasutamisel torgake aval olev kate läbi korgil oleva teravikuga ja pigistage tuubi.
- Kandke õhuke kiht geeli kahjustatud nahapiirkonnale ja selle ümbrusesse.
- Hõõruge geel kergelt naha sisse.
- Sulgege tuub korgiga.
- Peske käsi pärast kahjustatud nahapiirkonna puutumist, et nakkus ei leviks teistesse nahapiirkondadesse või teistele inimestele.

Kui tihti ja kui kaua tuleb Lamisil Dermgel'i kasutada

Jalalaba seenhaiguste (*tinea pedis*) raviks kasutatakse Lamisil Dermgel'i 1 kord päevas 1 nädala jooksul.

Jätkake geeli kasutamist soovitatud ajavahemiku jooksul, isegi kui haigussümptomid paari päeva jooksul taanduvad. Paranemist on märgata juba mõne päeva pärast, kuid infektsioon võib ilmneda uuesti kui kreemi ei kasutata regulaarselt või ravi lõpetatakse liiga vara.

Lamisil DermGel'i toimel on paranemine märgatav juba paari päeva pärast. Kahjustatud naha täielik paranemine võtab aega kauem, isegi kuni 4 nädalat. Lamisil DermGel'i toime jätkub pärast selle kasutamise lõppu. Paranemisprotsess jätkub vaatamata sellele, et te geeli ei kasuta.

Kui haigusnähud ei ole 2 nädala jooksul pärast ravi alustamist taandunud, tuleb pöörduda arsti poole.

Paranemise soodustamine

Paranemist soodustab see, kui hoiate ravitava nahapiirkonna puhtana, pestes seda regulaarselt. Kuivatage ettevaatlikult ilma hõõrumata. Sügelusele vaatamata püüdke vastavat piirkonda mitte kratsida, kuna see suurendab nahakahjustust ja aeglustab paranemisprotsessi või põhjustab nakkuse levikut.

Kuna need nakkused võivad levida teistele inimestele, ei tohi teie käterätti ega riideid kasutada keegi peale teie enda. Et kaitsta ennast taasnakatumise eest, peske neid tihti.

Kui te kasutate Lamisil Dermgel'i rohkem, kui ette nähtud

Kui teie või keegi teine peaks kogemata geeli alla neelama, informeerige sellest oma arsti, kes ütleb, mida teha.

Kui te unustate Lamisil Dermgel'i kasutada

Kui te unustate Lamisil DermGel'i manustada, tehke seda niipea kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise manustamise aeg, siis manustage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt.

Tähtis on kinni pidada geeli manustamise ettenähtud aegadest, sest vahelejäätud manustamiskorrad võivad suurendada haiguse taaspuhkemise ohtu.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Lamisil DermGel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik inimesi saavad Lamisil Dermgel'i kasutamisest abi.

Lõpetage Lamisil DermGel'i kasutamine ja otsige otsekohe arstiabi, kui teil ilmneb mõni järgmistest sümptomitest, kuna need võivad viidata allergilise reaktsiooni tekkele:

- hingamis- või neelamisraskused;
- näo-, huulte, keele- või kurguturse;
- raske naha sügelus punetava ja punnilise lööbega.

Mõned kõrvaltoimed esinevad sageli (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

Nahakoorumine, sügelus.

Mõned kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

Kolded või kärnad nahal, nahakahjustused, naha värvuse muutused, punetus, valu ja ärritus manustamiskohas.

Mõned kõrvaltoimed esinevad harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

Nahakuivus, ekseem.

Kontaktdermatiit, see on teatud tüüpi nahapõletik.

Nahalööve.

Haiguse sümptomite ägenemine.

Allergilised reaktsioonid.

Lamisil Dermgel'i ekslikul manustamisel silma võib esineda silmade ärritus.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.raviamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Lamisil Dermgel'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida tuubi suletuna välispakendis temperatuuril kuni 30°C.

Hoidke tuubi suletuna. 16 nädala möödumisel pärast esmast avamist tuleb järelejäänud ravim ära visata.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lamisil Dermgel sisaldab

Toimeaine on terbinafiin. 1 gramm geeli sisaldab 10 mg terbinafiini.

Abiained on puhastatud vesi, etanool 96%, isopropüülmüristaat, polüsorbaat 20, karbomeer, sorbitanlaureaat, bensüülalkohol, naatriumhüdroksiid, butüülhüdroksütolueen (E321).

Kuidas Lamisil Dermgel välja näeb ja pakendi sisu

Lamisil DermGel on saadaval membraaniga kaetud alumiiniumtuubis või lamineeritud tuubis, mis on seestpoolt kaetud epoksüfenoolvaigu lakiga. Tuub on suletud keeratava polüpropüleenkorgiga. Lamisil DermGel on valge kuni valkjalt läikiv geel.

Tuubis on 15 g geeli (käsimüügiravim).

Müügiloo hoidja ja tootja

Müügiloo hoidja

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

Knockbrack

Dungarvan

Co Waterford

Iirimaa

* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

Tootja

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstraße 4
80339 München
Saksamaa

Delpharm Huningue SAS
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2022.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Retseptiravim*

Lamisil DermGel, 10 mg/g geel terbinafiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Lamisil DermGel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Lamisil DermGel'i kasutamist
3. Kuidas Lamisil DermGel'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Lamisil DermGel'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Lamisil Dermgel ja milleks seda kasutatakse

Lamisil DermGel on seenevastase toimega geel, mis hävitab nahahaigust põhjustavad seened.

Lamisil DermGel'i kasutatakse dermatofüütide poolt põhjustatud naha seeninfektsioonide (*tinea pedis*, *tinea cruris*, *tinea corporis*) raviks.

Samuti kasutatakse seda ravimit naha pärmseente (*Malassezia furfur*) poolt põhjustatud nahahaiguse *Pityriasis versicolor* raviks.

Ravim on näidustatud täiskasvanutele ja noorukitele alates 12 aasta vanusest.

2. Mida on vaja teada enne Lamisil Dermgel'i kasutamist

Lamisil Dermgel'i ei tohi kasutada

- kui olete terbinafiini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lamisil Dermgel'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Kreemi kasutada ainult välispidiselt.
- Mitte kasutada suus või alla neelata.
- Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Imik ei tohi sattuda kontakti ema ravitava nahapiirkonnaga, kaasa arvatud ema rinnad.
- Vältida kontakti näo, silmade või kahjustatud nahaga (märgatavalt turses nahapiirkonnad), millele alkohol võib olla ärritava toimega (nt pärast päikese käes viibimist või raskekujulise naha ketenduse korral). Kui geel peaks kogemata silma sattuma, pühkige see ära ja loputage silma hoolikalt puhta veega. Kui ebamugavustunne püsib, pöörduge arsti poole.
- Ravim ei sobi küüne seennakkuse korral. Kui teil on küünte seeninfektsioon (seen on küüne all), esineb küüne värvuse ja struktuuri muutusi (paksenenud, helbeline), pöörduge arsti poole.
- Arvestage võimalusega, et kaasuv seennakkus võib ägeneda.

* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

Lapsed ja noorukid

Epabiisavate ohutus- ja efektiivsusandmete tõttu ei ole Lamisil Dermgel'i kasutamine alla 12-aastastel lastel soovitatav.

Muud ravimid ja Lamisil Dermgel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Ärge kasutage samaaegselt teisi ravimeid kahjustatud nahapiirkonnal.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Mitte kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui see on selgelt näidustatud.

Ärge kasutage Lamisil Dermgel'i rinnaga toitmise ajal. Toimeaine võib erituda rinnapiima. Imik ei tohi sattuda kontakti ema ravitava nahapiirkonnaga, kaasa arvatud ema rinnad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lamisil DermGel ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitlemise võimet.

Oluline teave mõningate Lamisil DermGel'i koostisainete suhtes

Lamisil Dermgel sisaldab butüülhüdrosütolueeni, mis võib põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti) või silmade ja limaskestade ärritust.

Ravim sisaldab 5 mg bensüülalkoholi ühes grammis geelis. Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone ja kergelt paikset ärritust.

Ravim sisaldab 100 mg alkoholi (etanool) ühes grammis geelis. See võib põhjustada kahjustatud nahal põletustunnet.

3. Kuidas Lamisil Dermgel'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline on kasutada Lamisil Dermgel'i õigesti. Järgige juhiseid.

Kui teil aga esineb küünte seenhaigus (seen küünes või selle all), millele on iseloomulik küünte värvuse ja struktuuri muutus (paksud, kihistunud küüned), tuleb pöörduda arsti poole, kuna Lamisil DermGel ei sobi seda tüüpi seenhaiguste raviks. Küüne seenhaiguse raviks tuleb kasutada Lamisil tablette, mis on saadaval vaid retseptiga.

Kasutamishüüsed:

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:

- Peske ja kuivatage käed ja ravitav nahapiirkond.
- Avage tuub, esmakordsel kasutamisel torgake aval olev kate läbi korgil oleva teravikuga ja pigistage tuubi.
- Kandke õhuke kiht geeli kahjustatud nahapiirkonnale ja selle ümbrusesse.
- Hõõruge geel kergelt naha sisse.
- Sulgege tuub korgiga.
- Peske käsi pärast kahjustatud nahapiirkonna puutumist, et nakkus ei leviks teistesse nahapiirkondadesse või teistele inimestele.

Kui infektsioon on voldilises nahapiirkonnas, võib selle katta näiteks marliga, eriti ööseks. Kasutage selleks igal korral puhast marlit.

* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

Kui tihti ja kui kaua tuleb Lamisil Dermgel'i kasutada

- Naha seeninfektsioonid kehal, jalasäärte või labajalgadel (*tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis*): 1 kord päevas 1 nädala kestel.
- Naha pärmseente infektsioon (*Pityriasis versicolor*): 2 korda päevas 1 nädala kestel.

Jätkake geeli kasutamist soovitatud ajavahemiku jooksul, isegi kui haigussümptomid paari päeva jooksul taanduvad. Paranemist on märgata juba mõne päeva pärast, kuid infektsioon võib ilmneda uuesti kui kreemi ei kasutata regulaarselt või ravi lõpetatakse liiga vara.

Lamisil DermGel'i toimel on paranemine märgatav juba paari päeva pärast. Kahjustatud naha täielik paranemine võtab aega kauem, isegi kuni 4 nädalat. Lamisil DermGel'i toime jätkub pärast selle kasutamise lõppu. Paranemisprotsess jätkub vaatamata sellele, et te geeli ei kasuta.

Kui haigusnähud ei ole 2 nädala jooksul pärast ravi alustamist taandunud, tuleb pöörduda arsti poole.

Paranemise soodustamine

Paranemist soodustab see, kui hoiate ravitava nahapiirkonna puhtana, pestes seda regulaarselt. Kuivatage ettevaatlikult ilma hõõrumata. Sügelusele vaatamata püüdke vastavat piirkonda mitte kratsida, kuna see suurendab nahakahjustust ja aeglustab paranemisprotsessi või põhjustab nakkuse levikut.

Kuna need nakkused võivad levida teistele inimestele, ei tohi teie käterätti ega riideid kasutada keegi peale teie enda. Et kaitsta ennast taasnakatamise eest, peske neid tihti.

Kui te kasutate Lamisil Dermgel'i rohkem, kui ette nähtud

Kui teie või keegi teine peaks kogemata geeli alla neelama, informeerige sellest oma arsti, kes ütleb, mida teha.

Kui te unustate Lamisil Dermgel'i kasutada

Kui te unustate Lamisil DermGel'i manustada, tehke seda niipea kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise manustamise aeg, siis manustage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt.

Tähtis on kinni pidada geeli manustamise ettenähtud aegadest, sest vahelejäätunud manustamiskorrad võivad suurendada haiguse taaspuhkemise ohtu.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Lamisil DermGel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik inimesi saavad Lamisil Dermgel'i kasutamisest abi.

Lõpetage Lamisil DermGel'i kasutamine ja otsige otsekohe arstiabi, kui teil ilmneb mõni järgmistest sümptomitest, kuna need võivad viidata allergilise reaktsiooni tekkele:

- hingamis- või neelamisraskused;
- näo-, huulte, keele- või kurguturse;
- raske naha sügelus punetava ja punnilise lööbega.

Mõned kõrvaltoimed esinevad sageli (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

Nahakoorem, sügelus.

Mõned kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

Kolded või kärnad nahal, nahakahjustused, naha värvuse muutused, punetus, valu ja ärritus manustamiskohas.

Mõned kõrvaltoimed esinevad harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

Nahakuivus, ekseem.
Kontaktdermatiit, see on teatud tüüpi nahapõletik.
Nahalööve.
Haiguse sümptomite ägenemine.
Allergilised reaktsioonid.
Lamisil Dermgel'i ekslikul manustamisel silma võib esineda silmade ärritus.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Lamisil Dermgel'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoidke tuubi suletuna. 16 nädala möödumisel pärast esmast avamist tuleb järelejäänud ravim ära visata.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lamisil Dermgel sisaldab

Toimeaine on terbinafiin. 1 gramm geeli sisaldab 10 mg terbinafiini.
Abiained on puhastatud vesi, etanool 96%, isopropüülmüristaat, polüsorbaat 20, karbomeer, sorbitanlaureaat, bensüülalkohol, naatriumhüdroksiid, butüülhüdroksütolueen (E321).

Kuidas Lamisil Dermgel välja näeb ja pakendi sisu

Lamisil DermGel on saadaval membraaniga kaetud alumiiniumtuubis või lamineeritud tuubis, mis on seestpoolt kaetud epoksüfenoolvaigu lakiga. Tuub on suletud keeratava polüpropüleenkorgiga. Lamisil DermGel on valge kuni valkjalt läikiv geel.
Tuubis on 30 g geeli (retseptiravim).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack
Dungarvan
Co Waterford
Iirimaa

Tootja

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstraße 4
80339 München
Saksamaa

* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

Delpharm Huningue SAS
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2022.

* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim