

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus Naatriumkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahuse kasutamist
3. Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus ja milleks seda kasutatakse

See ravim on naatriumkloriidi lahus, mida manustatakse süstina.

See sisaldab naatriumkloriidi sellises kontsentratsioonis, mis on sarnane teie vere sooladesisaldusele.

Seda kasutatakse ravimite manustamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahuse kasutamist

Ärge kasutage Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust, kui teil on:

- väga kõrge vere naatriumisisaldus (raske hüpernatreemia)
- väga kõrge vere kloriidisisaldus (raske hüperkloreemia)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahuse kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahusega,

- kui teie vere naatriumisisaldus on normist kõrgem (hüpernatreemia)
- kui teie vere kloriidisisaldus on normist kõrgem (hüperkloreemia)

Muud ravimid ja Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui võtate ravimeid, mis aitavad suurendada naatriumisisaldust veres (kortikosteroidid, teatud põletikuvastased ained), ja teile manustatakse Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust, võib tekkida turse (ödeem).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Kuna naatriumi ja kloriidi kontsentratsioonid sarnanevad inimorganismis esinevatele kontsentratsioonidele, ravimi kasutamisel selleks ettenähtud viisil kahjulikku toimet ei eeldata.

Imetamine

Kuna naatriumi ja kloriidi kontsentratsioonid sarnanevad inimorganismis esinevatele kontsentratsioonidele, ravimi kasutamisel selleks ettenähtud viisil kahjulikku toimet ei eeldata. Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust võib vajaduse korral kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust kasutada

Seda ravimit kasutatakse süstide ettevalmistamiseks (süstla kaudu manustatavad ravimid). Seda manustatakse teile veeni (intravenoosselt), lihasesse (intramuskulaarselt) või naha alla (subkutaanselt).

Annustamine

Kasutatav kogus sõltub lahustatava või lahjendatava ravimi kohta antud juhistest.

Kui te kasutate Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võib teil tekkida vedeliku kuhjumine organismi, naatriumi, kloriidide ja ja happeliste ainete taseme ülemäärane suurenemine teie veres (veri muutub happeliseks).

Sellisel juhul peatatakse süstimine koheselt. Lisaks antakse teile veetablette, et suurendada uriinieritust. Teie vere elektrolüütide taset jälgitakse pidevalt. Teie arst otsustab ravimite edasise kasutamise või meetmete üle, et normaliseerida teie elektrolüütide taset, vee ja happe-aluse tasakaalu.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimi kasutamisel vastavalt juhistele kõrvaltoimete tekkimist ei eeldata.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ampullil või välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et lahus on hägune või kui pakend või selle kork lekib.

Pärast kasutusvalmis segu ettevalmistamist:

Mikrobioloogilisest vaatepunktist lähtudes tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit kohe ei kasutata, vastutab kasutusaegse aja ja kasutuseelsete säilitustingimuste eest kasutaja ning tavatingimustes ei tohi see olla kauem kui 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus sisaldab:

- Toimeaine on naatriumkloriid.
Üks ml lahust sisaldab 9 mg naatriumkloriidi.
- Teine koostisosa on süstevesi.

Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% välja näeb ja pakendi sisu

Sodium Chloride B. Braun 0,9% on selge, värvitu naatriumkloriidi vesilahus.

Ravim on saadaval:

- Kummikorgiga klaasviaalides, mis sisaldavad 50 ml või 100 ml lahust. 20 viaaliga pakendid.
- Polüetüleenampullides, mis sisaldavad 10 ml või 20 ml lahust. 20 ampulliga pakendid.
- Polüpropüleenampullides, mis sisaldavad 10 ml või 20 ml lahust. 50 või 100 ampulliga pakendid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

B. Braun Melsungen AG
D-34212 Melsungen
Saksamaa

Postiaadress:

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Saksamaa

Tel.: +49/5661/71-0

Fax: +49/5661/71 4567

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

B. Braun Medical OÜ
Pilvetee tn.8
12618, Tallinn
Tel.:(0) 677 12 00

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2021.