

## Pakendi infoleht: teave patsiendile

### Traumeel S tabletid

Arnica montana D2 15 mg, Calendula officinalis D2 15 mg, Hamamelis virginiana D2 15 mg, Achillea millefolium D3 15 mg, Atropa belladonna D4 75 mg, Aconitum napellus D3 30 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30 mg, Hepar sulfuris D8 30 mg, Matricaria recutita D3 24 mg, Symphytum officinale D8 24 mg, Bellis perennis D2 6 mg, Echinacea D2 6 mg, Echinacea purpurea D2 6 mg, Hypericum perforatum D2 3 mg

### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Traumeel S ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Traumeel S'i kasutamist
3. Kuidas Traumeel S'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Traumeel S'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### 1. Mis ravim on Traumeel S ja milleks seda kasutatakse

Traumeel S on homöopaatiline preparaat.

#### 2. Mida on vaja teada enne Traumeel S'i kasutamist

##### Traumeel S'i ei tohi võtta

- kui te olete allergiline või ülitundlik Traumeel S'i mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.
- kui te olete allergiline või ülitundlik arnikale, kummelile, raudrohule või teiste korvõieliste taimede suhtes.

##### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Traumeel S'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arsti või apteekriga.

Kuna see toode sisaldab ehhiatseat, pidage nõu oma tervishoiutöötajaga, kui teil on mõni järgmistest seisunditest: progresseeruvad süsteemsed häired, autoimmuunhaigused, immuunpuudulikkus, immunosupressioon ja valgete vereliblede süsteemhaigused.

##### Traumeel S sisaldab laktoosi

Antud preparaat sisaldab laktoosi 6mg. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

### Muud ravimid ja Traumeel S

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

### **Rasedus ja imetamine**

Teadaolevalt ei ole selles ravimipreparaadis sisalduvate ainete homöopaatilised lahjendused raseduse ja imetamise ajal kahjulikud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Traumeel S'i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

## **3. Kuidas Traumeel S'i võtta**

Võtke Traumeel S'i alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni.

Kuna see ravim sisaldab päevakübarat, pikemaajalisel kasutamisel (üle 8 nädala ja rohkem) pidage nõu arsti või apteekriga.

### **Kui te võtate Traumeel S'i rohkem, kui ette nähtud**

Üleannustamise juhtudest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu. Kui olete soovitatava annuse ületanud, pidage nõu arsti või apteekriga.

### **Kui te unustate Traumeel S'i võtta**

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

### **Kui te lõpetate Traumeel S'i võtmise**

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka Traumeel S põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üksikutel juhtudel võivad tekkida naha lööve, hingeldus, iiveldus ja vererõhu langus.

Kui ravimi tarvitamise järgselt süljeeritus suureneb, on soovitatav ravimi tarvitamine lõpetada.

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi kaudu, mis on saadaval Ravimiameti veebilehel [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee). Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Traumeel S'i säilitada**

See ravimipreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Traumeel S'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja purgi etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## 6. Pakendi sisu ja muu teave

### Mida Traumeel S sisaldab

1 tablett sisaldab:

Toimeained:

|                                |    |       |
|--------------------------------|----|-------|
| Arnica montana                 | D2 | 15 mg |
| Calendula officinalis          | D2 | 15 mg |
| Hamamelis virginiana           | D2 | 15 mg |
| Achillea millefolium           | D3 | 15 mg |
| Atropa belladonna              | D4 | 75 mg |
| Aconitum napellus              | D3 | 30 mg |
| Mercurius solubilis Hahnemanni | D8 | 30 mg |
| Hepar sulfuris                 | D8 | 30 mg |
| Matricaria recutita            | D3 | 24 mg |
| Symphytum officinale           | D8 | 24 mg |
| Bellis perennis                | D2 | 6 mg  |
| Echinacea                      | D2 | 6 mg  |
| Echinacea purpurea             | D2 | 6 mg  |
| Hypericum perforatum           | D2 | 3 mg  |

Abiained: laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat

### Kuidas Traumeel S välja näeb ja pakendi sisu

Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakas-valge, siledapinnaline tablett, kohati muutuvad nähtavaks kollakaspruunid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused diameetriga 9,0 - 9,1 mm. Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.

### Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
DE-76532 Baden-Baden  
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS  
Võru tn 11  
13612 Tallinn  
Eesti

**Infoleht on viimati uuendatud septembris 2022.**