

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Engystol tabletid

Vincetoxicum hirundinaria D6 75,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75,0 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Engystol ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Engystol'i kasutamist
3. Kuidas Engystol'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Engystol'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Engystol ja milleks seda kasutatakse

Engystol on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne Engystol'i kasutamist

Engystol'i ei tohi kasutada

- kui te olete allergiline või ülitundlik mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Engystol'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arsti või apteekriga.

Engystol sisaldab laktoosi

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Muud ravimid ja Engystol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Koostoimest teiste ravimitega ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Rasedus ja imetamine

Teadaolevalt ei ole selles ravimpreparaadis sisalduvate ainete homöopaatilised lahjendused raseduse ja imetamise ajal kahjulikud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Engystol'i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

3. Kuidas Engystol'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 1 tablett 3 korda päevas .

Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 1 tablett 2 korda päevas.

Lapsed vanuses 2...5 aastat: võtta 1 tablett 1...2 korda päevas.

Tabletid lasta sulada aeglaselt suus toidukordade vahel. Lastele manustamisel võib tableti purustada ja lahustada väikeses koguses vees.

Kui te võtate Engystol'i rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Kui olete soovitatava annuse ületanud, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te unustasite Engystol'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Engystol'i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Engystol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üksikjuhtudel on teatatud mööduvatest nahareaktsioonidest (nt lööve, sügelus või erüteem) ja seedetrakti kaebustest (nt kõhuvalu või ebamugavustunne).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi kaudu, mis on saadaval Ravimiameti veebilehel www.ravimiamet.ee. Teatades aitade saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Engystol'i säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Engystol'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja purgi etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Engystol sisaldab

1 tablett sisaldab:

- Toimeained:

Vincetoxicum hirundinaria	D6	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D10	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D30	75,0 mg
Sulfur	D4	37,5 mg
Sulfur	D10	37,5 mg

- Teised koostisosad:

Laktoosmonohüdraat 300 mg
Magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Engystol välja näeb ja pakendi sisu

Tableti kirjeldus: valge kuni kollakas-valkjäs tablett, ümmargune, sileda pinnaga ja töödeldud servadega. Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2022.