

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Prospan, 35 mg/5 ml suukaudne lahus** luuderohu lehtede kuivekstrakt

#### **Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Prospan ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Prospan-i võtmist
3. Kuidas Prospan-i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Prospan-i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Prospan ja milleks seda kasutatakse**

Prospan-i suukaudset lahust kasutatakse köha korral röga lahustamiseks.

#### **2. Mida on vaja teada enne Prospan-i võtmist**

##### **Prospan suukaudset lahust ei tohi võtta**

- kui olete luuderohu või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Fruktoositalumatusega patsientidel, kuna ravim sisaldab magusainet sorbitooli.

##### **Lapsed**

Prospan suukaudne lahus pole mõeldud kasutamiseks alla 6-aastastel lastel.

##### **Muud ravimid ja Prospan**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Prospan-i samaaegsel kasutamisel teiste ravimitega tekkida võivatest kõrvaltoimetest siiani andmed puuduvad.

##### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Prospan-i kasutamisest rasedatel ja imetavatel emadel pole piisavalt läbi viidud uuringuid, seetõttu ei tohiks seda ravimit kasutada raseduse ja imetamise ajal.

##### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Eesmärgipärasel kasutamisel toime reaktsioonikiirusele puudub.

##### **Prospan sisaldab sorbitooli**

See ravim sisaldab 1,9 g sorbitooli 5 ml lahuses (ühes kotikeses). Sorbitool on fruktoosi allikas. Kui arst on teile öelnud, et te (või teie laps) ei talu teatud suhkruid või kui teil on diagnoositud pärilik harvaesinev fruktoositalumatus (mistõttu organism ei suuda fruktoosi lagundada), peate enne ravimi kasutamist pidama nõu arstiga.

### Prospan sisaldab alkoholi

Prospan suukaudne lahus sisaldab 0,51 mg alkoholi (etanooli) igas milliliitris, mis vastab 0,05%-le. Alkoholi sisaldus selle ravimi ühes annuses (5 ml) on väiksem kui 1 ml õlles või 1 ml veinis. Väike kogus alkoholi selles ravimis ei oma märkimisväärset toimet.

### 3. Kuidas Prospan-i võtta


Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teie arst pole teisiti määranud, siis soovitatav annus on:


Vanus	Üksikannus	Kogu päevaannus
Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid	5 ml lahust (üks kotike) (35 mg luuderohu lehtede kuivekstrakti).	15 ml lahust (üks kotike kolm korda ööpäevas) (105 mg luuderohu lehtede kuivekstrakti)
Lapsed vanuses 6 ..11 aastat	5 ml lahust (üks kotike) (35 mg luuderohu lehtede kuivekstrakti)	10 ml lahust (üks kotike kaks korda ööpäevas) (70 mg luuderohu lehtede kuivekstrakti)

Ravimit tuleb võtta lahjendamata kujul hommikul, (lõunal) ja õhtul.


Prospan suukaudne lahus on kotikestes, mida on lihtne avada ning kasutada. Joonisel on näidatud, kuidas kotikest kasutada.



Enne kasutamist mudi kotikest õrnalt.



Hoia kotikest tugevalt ning rebi ära serv.



Aseta kotike suu kohale ja pigista tühjaks suhu.

Ravi kestus sõltub haiguse sümptomite tüübist ja raskusest. Ravi peaks kestma vähemalt nädal aega, isegi kui tegemist on hingamisteede kergema põletikuga. Et kindlustada püsivat ja lõplikku ravitulemust, siis on soovitatav jätkata ravimi võtmist veel 2...3 päeva jooksul pärast sümptomite taandumist.

### Kui te võtate Prospan-i rohkem, kui ette nähtud

Soovitatud annust ei tohiks ületada. Ravimi lubatust tunduvalt suuremates annustes (rohkem kui kolmekordne päevaannus) sissevõtmise korral võib esineda iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Palun konsulteerige oma arsti või apteekriga.

### Kui te unustate Prospan-i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

### **Kui te lõpetate Prospan-i võtmise**

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete liigitamiseks sageduse järgi kasutatakse järgmisi kategooriaid:

Väga sage: Rohkem kui 1 patsiendil 10 ravitud patsiendist
Sage: 1..10 patsiendil 100 ravitud patsiendist
Aeg-ajalt: 1..10 patsiendil 1000 ravitud patsiendist
Harv: 1...10 patsiendil 10 000 ravitud patsiendist
Väga harv: Vähem kui ühel patsiendil 10 000 patsiendist
Sagedus teadmata: Sagedust pole võimalik hinnata teadaolevate andmete põhjal

Väga harv:

Allergilised reaktsioonid (hingamispuudulikkus, paistetus, naha punetus, sügelus) võivad esineda luuderohu sisaldavate preparaatide võtmisel.

Aeg-ajalt:

Tundlikel patsientidel võivad tekkida seedetrakti kaebused (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus).

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Prospan'i säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Prospan sisaldab**

- Toimeaine on luuderohu lehtede ekstrakt. 5 ml lahust (üks kotike) sisaldab 35 mg luuderohu lehtede kuivekstrakti (5...7,5:1). Ekstrahent: etanool 30 % V/V.

- Teised koostisosad on kaaliumsorbaat (E202), veevaba sidrunhape (E330), ksantaankummi (E415), vedel (kristalluv) sorbitool (E420), lõhna- ja maitseained (apelsin, mentool), levomentool, puhastatud vesi.

#### **Kuidas Prospan välja näeb ja pakendi sisu**

Prospan suukaudne lahus on üksikannustena 5 ml alumiinium-fooliumkotikestes. Üksikannused pakendatud karpi. Karbis on 21 kotikest.

Ravim sisaldab looduslikku taimset ekstrakti ning seetõttu võib preparaadi värvus ja maitse kohati varieeruda. See ei mõjuta preparaadi terapeutilist toimet.

#### **Müügiloa hoidja ja tootja**

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Herzbergstr. 3  
D-61138 Niederdorfelden  
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:  
Swixx Biopharma OÜ  
Tel: +372 640 1030  
e-post: [medinfo.estonia@swixxbiopharma.com](mailto:medinfo.estonia@swixxbiopharma.com)

**Infoleht on viimati uuendatud novembris 2022.**