

## Pakendi infoleht: teave kasutajale

### DESIRETT, 75 mikrogrammi õhukese polümeerikattega tabletid Desogestreel

#### **Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on DESIRETT ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne DESIRETT'i võtmist
3. Kuidas DESIRETT'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas DESIRETT'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on DESIRETT ja milleks seda kasutatakse**

DESIRETT'i kasutatakse raseduse vältimiseks.

DESIRETT sisaldab väikeses koguses ühte tüüpi naissuguhormooni, gestageeni desogestreeli. Seetõttu nimetatakse DESIRETT'i ainult gestageeni sisaldavaks pilliks (*progestogen-only-pill*, POP) ehk minipilliks.

Vastupidiselt kombineeritud pillidele ei sisalda POP ehk minipill östrogeenset hormooni, vaid ainult gestageeni.

Enamus POP-e ehk minipille toimib peamiselt takistades spermarakkude sisenemist emakasse, kuid need ei takista alati munaraku valmimist, mis on kombineeritud pillide peamiseks toimeks.

DESIRETT erineb teistest minipillidest selle poolest, et selle annus on enamikul juhtudel küllaldane, takistamaks munaraku valmimist. Selle tulemusena on DESIRETT'i rasestumisvastane kaitse tõhusam. Vastupidiselt kombineeritud pillidele võivad DESIRETT'i kasutada ka naised, kes ei talu östrogeene ja last imetavad naised.

Puuduseks on see, et DESIRETT'i kasutamise ajal võivad esineda ebaregulaarsete intervallidega veritsused tupest. Võib juhtuda ka, et teil ei teki üldse veritsust.

#### **2. Mida on vaja teada enne DESIRETT'i võtmist**

**DESIRETT, nagu ka teised hormonaalsed rasestumisvastased vahendid, ei kaitse HIV-nakkuse (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.**

#### **Ärge võtke DESIRETT'i**

- kui te olete desogestreeli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on tromboos. Tromboos on verehüübe moodustumine veresoones (nt jalgades (süvaveenide tromboos) või kopsudes (kopsuarteri trombemboolia)).
- kui teil on praegu või on varem olnud kollatõbi (naha muutumine kollakaks) või raske maksahaigus ja teie maksafunktsioon ei ole veel normaliseerunud.
- kui teil on või teil kahtlustatakse vähki, mis areneb teatud suguhormoonide mõjul, nt teatud tüüpi rinnaäärmevähk.
- kui teil on ebaselge põhjusega veritsus tupest.
- kui te olete maapähkli või soja suhtes allergiline.

Kui mõni neist seisunditest kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile enne DESIRETT'i kasutama hakkamist. Teie arst võib teil soovitada kasutada mittehormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid.

Kui mõni neist seisunditest ilmneb esmakordselt DESIRETT'i kasutamise ajal, pidage otsekohe nõu oma arstiga.

### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne DESIRETT'i võtmist, rääkige oma arstile, apteekrile või pereplaneerimise nõustajale kui:

- teil on kunagi olnud rinnanäärmevähk.
- teil on maksavähk, kuna ei saa välistada võimalikku DESIRETT'i toimet.
- teil on kunagi olnud tromboos.
- teil on suhkurtõbi.
- teil on epilepsia (vt lõik „Muud ravimid ja DESIRETT“).
- teil on tuberkuloos (vt lõik „Muud ravimid ja DESIRETT“).
- teil on kõrge vererõhk.
- teil on või on varem olnud kloasme (kollakaspruunid pigmendilaigud nahal, eriti näonahal); sellisel juhul hoiduge liigest päikese- või ultraviolettkiirgusest.

Kui DESIRETT'i kasutatakse nende seisundite korral, võite te vajada hoolikamat arstlikku järelevalvet. Teie arst selgitab teile, mida tuleb teha.

### **Rinnanäärmevähk**

Oluline on kontrollida regulaarselt oma rindu ja võtke niipea kui võimalik ühendust oma arstiga, kui te tunnete oma rinnas mingit tükki. Rinnanäärmevähi on leitud pisut sagedamini naistel, kes kasutavad pille, võrreldes samaealiste naistega, kes neid ei kasuta. Kui naine lõpetab pillide võtmise, vähendab see riski, nii et 10 aastat pärast pillide võtmise lõpetamist on rinnanäärmevähi esinemise risk sama, mis naistel, kes pole kunagi pille kasutanud.

Rinnanäärmevähk on harvaesinev alla 40 aasta vanustel naistel, kuid risk kasvab koos vanuse suurenemisega. Seega on rinnanäärmevähi diagnooside arv suurenenud, kui naine jätkab pillide kasutamist vanemaks saades.. See, kui kaua ta pille võtab, on vähem tähtis.

Iga 10 000 naise kohta, kes võtavad pille kuni 5 aastat, kuid lõpetavad nende võtmise 20.-ks eluaastaks, ilmneb lisaks neljale selles vanuserühmas tavaliselt diagnoositavale juhule vähem kui 1 rinnanäärmevähi lisajuht 10 aasta jooksul pärast pillide kasutamise lõpetamist.

Iga 10 000 naise kohta, kes võtavad pille kuni 5 aastat, kuid lõpetavad nende võtmise 30.-ks eluaastaks, ilmneb 5 rinnanäärmevähi lisajuhtu, lisaks 44 tavaliselt diagnoositud juhule.

Iga 10 000 naise kohta, kes võtavad pille kuni 5 aastat, kuid lõpetavad nende võtmise 40.-ks eluaastaks, ilmneb 20 lisajuhtu, lisaks 160 tavaliselt diagnoositud juhule.

Ainult gestageeni sisaldavate pillide (nagu DESIRETT) kasutajatel on rinnanäärmevähi risk arvatavalt sarnane naistele, kes kasutavad kombineeritud pille, kuid vastavad tõendid ei ole lõplikud.

Rinnanäärmevähk, mida on leitud pille võtvatel naistel, tundub olevat vähem kaugelearenenud kui naistel, kes ei võta pille. Ei ole kindel, kas pillid põhjustavad rinnanäärmevähi suurenenud tekkeriski. See võib olla tingitud asjaolust, et pille kasutavaid naisi kontrollitakse tihedamini, nii et rinnanäärmevähk avastatakse neil varem.

### **Tromboos**

Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui te märkate võimalikke tromboosi tunnuseid (vt ka lõik „Regulaarsed kontrollid“). Tromboos on verehüüvete moodustumine, mis võivad ummistada veresoone. Tromboos tekib mõnikord jalgade süvaveenides (süvaveenide tromboos). Kui tekkinud hüüve tuleb oma moodustumiskohas veresoone seina küljest lahti, võib see jõuda kopsuarteritesse ja neid ummistada, põhjustades kopsuarteri trombembooliat. Kopsuarteri trombemboolia võib põhjustada valu rindkeres, hingeldust, kollapsit või isegi surma. Süvaveenide tromboosi esineb harva. See võib tekkida sõltumata sellest, kas te võtate pille või mitte. See võib tekkida ka raseduse ajal. Pillide kasutajatel on risk suurem kui mittekasutajatel. Ainult gestageeni sisaldavate pillide puhul (nagu

DESIRETT) arvatakse risk olevat väiksem kui lisaks ka östrogeeni sisaldavate pillide (kombineeritud pillide) kasutajatel.

### **Psühhiaatrilised häired**

Osa naisi, kes on kasutanud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, sh DESIRETT, on teatanud depressioonist või meeleolu langusest. Depressioon võib olla tõsine ning põhjustada mõnikord enesetapumõtteid. Kui teil tekivad meeleolumuutused või depressiooni sümptomid, pöörduge abi saamiseks võimalikult kiiresti oma arsti poole.

### **Kasutamine noorukitel**

Kliinilised andmed efektiivsuse ja ohutuse kohta alla 18-aastastel noorukitel puuduvad.

### **Muud ravimid ja DESIRETT**

Teatage oma arstile, apteekrile või pereplaneerimisnõustajale, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid või taimseid ravimeid.

Teavitage ka teisi arste või hambaarste, kes kirjutavad teile välja muid ravimeid, et te võtate DESIRETT'i. Nemed ütlevad teile, kas ja kui kaua te peate kasutama rasestumisvastaseid lisavahendeid (nt kondoom) või kas teise teile vajaliku ravimi kasutamist peab muutma.

Mõned ravimid:

- võivad mõjutada DESIRETT'i sisaldust veres;
- võivad vähendada selle rasestumisvastast toimet;
- võivad põhjustada ootamatut veritsust.

Nende hulka kuuluvad järgmiste haiguste ravimid:

- epilepsia (nt primidoon, fenütoiin, karbamasepiin, okskarbasepiin, felbamaat, topiramaat ja fenobarbitaal),
- tuberkuloos (nt rifampitsiin, rifabutiin),
- HIV-nakkus (nt ritonaviir, nelfinaviir, nevirapiin, efavirens)
- C-hepatiit viirusinfektsioon (nt botsepreviir, telapreviir)
- või teised nakkushaigused (nt griseofulviin),
- kõrge vererõhk kopsuveresoontes (bosentaan)
- depressiivne meeleolu (taimne ravim naistepunaürt)
- teatud bakteriaalsed infektsioonid (nt klaritromütsiin, erütromütsiin);
- seeninfektsioonid (nt ketokonasool, itrakonasool, flukonasool);
- kõrge vererõhk (hüpertensioon),
- stenokardia või teatud südame rütmihäired (nt diltiaseem).

Kui te võtate ravimeid või taimseid preparaate, mis võivad vähendada DESIRETT'i toimet, peate te kasutama lisaks rasestumisvastaseid barjäärimeetodeid. Kuna teise ravimi mõju DESIRETT'ile võib kesta kuni 28 päeva pärast ravimi võtmise lõpetamist, on vajalik niikaua kasutada täiendavat rasestumisvastast barjäärimeetodit.

Teie arst ütleb teile, kas te peate lisaks kasutama muid rasestumisvastaseid abinõusid, ja kui peate, siis kui kaua.

DESIRETT võib mõjutada ka seda, kuidas teatud ravimid toimivad, põhjustades kas nende toime tugevnemist (nt ravimid, mis sisaldavad tsüklosporiini) või toime nõrgenemist (nt lamotrigiini).

### **Rasedus ja imetamine**

#### Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage DESIRETT'i, kui te olete rase või arvate, et võite olla rasestunud.

#### Imetamine

DESIRETT'i võib kasutada imetamise ajal. DESIRETT ei näi mõjutavat rinnapiima tootmist ega selle kvaliteeti. Harva on siiski teatatud rinnapiima tootmise vähenemisest DESIRETT kasutamise ajal. Piima eritub väike kogus DESIRETT toimeainet.

DESIRETT'i kasutavate emade 7 kuu jooksul rinnaga toidetud laste tervist uuriti nende 2,5-aastaseks saamiseni. Toimet laste kasvamisele ja arengule ei täheldatud.

Kui te toidate last rinnaga ja tahate DESIRETT'i kasutada, võtke palun ühendust oma arstiga.

#### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

DESIRETT ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

#### **DESIRETT sisaldab laktoosi (piimasuhkur) ja sojaõli.**

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kui te olete allergiline maapähklile või sojale, ärge kasutage seda ravimit.

#### **Regulaarsed kontrollid**

Kui te kasutate DESIRETT'i, kutsub teie arst teid tagasi regulaarseks kontrolliks. Üldiselt sõltub kontrollide sagedus ja iseloom teie seisundist.

#### **Võtke oma arstiga niipea kui võimalik ühendust, kui:**

- te märkate sümptomeid, mis võivad viidata trombile, nt tugev valu või turse ükskõik kummas jalas, ebaselge põhjusega valud rinnus, õhupuudus, ebatavaline kõha, eriti kui te kõhite verd (võimalikud tromboosi nähud);
- teil on äkiline, tugev kõhuvalu või nahakollasus (teie nahk või silmavalged muutuvad kollakaks, uriin on tumedat värvi, mis on võimalike maksaprobleemide tunnus);
- te tunnete tükki rinnas (võimalik rinnanäärmevähi tunnus);
- teil on järsk või tugev valu alakõhus või mao piirkonnas (võimalik ektoopilise raseduse ehk emakavälise raseduse tunnus);
- te olete liikumisvõimetu või teile plaanitakse teha kirurgiline operatsioon (konsulteerige arstiga vähemalt neli nädalat enne seda);
- teil on ebaharilik, tugev veritsus tupest;
- te kahtlustate, et olete rase.

### **3. Kuidas DESIRETT'i võtta**

#### **Kuidas ja millal tablette võtta?**

DESIRETT'i pakendis on 28 tabletti. Blistrile on trükitud nädalapäevad ja nooled, mis näitavad tablettide võtmise järjekorda. Igale nädalapäevale vastab üks tablett. Iga kord, kui te alustate uut DESIRETT'i pakendit, võtke esimesena tablett ülemisest reast. Ärge alustage lihtsalt ükskõik millisest tabletist. Näiteks kui te alustate kolmapäeval, peate te võtma tableti ülemisest reast selle koha pealt, mille juures on tagumisele küljele märgitud kolmapäev. Jätkake, võttes ühe tableti päevas, kuni pakend on tühi, järgides alati noolte suunda. Vaadates pakendi tagumist külge, saate te lihtsalt kontrollida, kas olete oma vastava päeva tableti juba võtnud. Võtke oma igapäevane tablett iga päev ligikaudu samal ajal.

Neelake tablett alla tervelt koos veega. Kuigi DESIRETT'i kasutamise ajal võib teil esineda mõningast veritsust, peate te jätkama tablettide võtmist nagu tavaliselt. Kui pakend on tühi, peate te alustama uue DESIRETT'i pakiga juba järgmisel päeval – seega ilma tabletivaba perioodita ja verejooksu ootamata.

#### **Millal alustada esimese DESIRETT'i pakendiga**

*Kui viimase kuu jooksul pole kasutatud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit*

Oodake, kuni algab menstruatsioon. Menstruatsiooni esimesel päeval võtke esimene DESIRETT'i tablett. Teil ei ole vaja kasutada lisaks teisi rasestumisvastaseid vahendeid.

Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2. kuni 5. päeval, kuid siis peate esimesel seitsmel tabletivõtmise päeval kasutama lisaks täiendavat rasestumisvastast meetodit (barjäärimeetod).

#### *Üleminek kombineeritud pillidelt, tuperõngalt või transdermaalselt plaastrilt*

Te võite alustada DESIRETT'i võtmist järgmisel päeval pärast eelnevalt kasutatud pillide viimase tableti võtmist või tuperõnga või plaastri eemaldamise päeval (see tähendab ilma tableti-, rõnga- või plaastrivaba perioodita). Kui eelmiste pillide pakend sisaldas ka mitteaktiivseid tablette, siis võite te DESIRETT'i võtmist alustada järgmisel päeval pärast viimase aktiivse (toimeainet sisaldav) tableti võtmist (kui te pole kindel, milline see on, küsige oma arstilt või apteekrilt). Kui te järgite neid juhiseid, ei ole teil vaja kasutada lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid.

Te võite alustada ka hiljemalt eelnevalt kasutatud rasestumisvastase vahendi tableti-, rõnga- või plaastrivabale perioodile või viimase platseebot sisaldava tableti võtmisele järgneval päeval. Kui te järgite neid nõuandeid, pidage meeles, et esimesel seitsmel tabletivõtmise päeval peate te kasutama lisaks täiendavat rasestumisvastast meetodit (barjäärimeetod).

#### *Üleminek teiselt ainult gestageeni sisaldavalt pillilt (minipillilt)*

Te võite lõpetada eelmiste minipillide võtmise igal ajal ning alustada kohe DESIRETT'i võtmist. Teil ei ole vaja kasutada lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid.

#### *Üleminek süstitavalt või implanteeritavalt rasestumisvastaselt vahendilt või ainult gestageeni vabastavalt emakasiseselt vahendilt (ESV)*

Alustage DESIRETT'i võtmist päeval, millal järgmine süste peaks tehtama või implantaadi või ESV eemaldamise päeval. Teil ei ole vaja kasutada lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid.

#### *Pärast sünnitust*

Te võite DESIRETT'iga alustada 21. kuni 28. sünnitusjärgsel päeval. Kui te alustate hiljem, pidage meeles, et esimese tsükli ajal peate te kasutama esimesel seitsmel tabletivõtmise päeval lisaks täiendavat rasestumisvastast meetodit (barjäärimeetod).

Kui seksuaalvahekord on siiski eelnevalt toimunud, tuleb enne DESIRETT'i kasutamise algust välistada rasedus. Lisainfot imetavatele emadele vt lõik „Rasedus ja imetamine“ lõigus 2. Samuti nõustab teid teie arst.

#### *Pärast iseeneslikku või meditsiinilist aborti*

Teie arst annab teile nõu.

#### **Kui te unustate DESIRETT'i võtta**

Kui te olete tableti võtmisega hilinenud **vähem kui 12 tundi**, siis DESIRETT'i usaldusväärsus säilib. Võtke vahelejäanud tablett niipea, kui see teile meenub ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal.

Kui te olete tableti võtmisega hilinenud **rohkem kui 12 tundi**, siis võib DESIRETT'i usaldusväärsus olla vähenenud. Mida rohkem järjestikuseid tablette teil on jäänud võtmata, seda suurem on oht, et rasestumisvastane toime on vähenenud. Võtke viimane ununenud tablett niipea, kui see teile meenub ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Kasutage lisaks täiendavat rasestumisvastast meetodit (barjäärimeetod) järgmisel seitsmel tabletivõtmise päeval. Kui te unustasite võtta ühe või rohkem tablette tabletivõtmise esimesel nädalal ning te olite seksuaalvahekorras nädala jooksul enne ununenud tablette, siis on olemas võimalus, et olete rasestunud. Küsige nõu oma arstilt.

#### **Kui teil on seedehäired (nt oksendamine, tugev kõhulahtisus)**

Järgige ülalpool toodud soovitusi võtmata jäänud tablettide kohta. Kui te oksendate või kasutate meditsiinilist sütt 3...4 tunni jooksul pärast DESIRETT'i tableti võtmist või teil on tugev kõhulahtisus, siis ei pruugi toimeaine olla täielikult imendunud.

#### **Kui te võtate DESIRETT'i rohkem kui ette nähtud**

Pärast liiga paljude DESIRETT'i tablettide korruga võtmist ei ole teatatud tõsiselt kahjulikest tagajärgedest. Kui olete korruga võtnud mitu tabletti, võivad teil tekkida iiveldus, oksendamine või veritsus tupest. Kui avastate, et teie laps on võtnud mitu tabletti, pidage nõu oma arstiga.

## **Kui te lõpetate DESIRETT'i võtmise**

Te võite DESIRETT'i võtmise lõpetada igal ajal, kui te seda soovite. Päevast, mil te lõpetate, ei ole te enam rasestumise vastu kaitstud.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka DESIRETT põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Tõsiseid kõrvaltoimeid, mida seostatakse DESIRETT'i kasutamisega, on kirjeldatud lõigus 2 „Mida on vaja teada enne DESIRETT'i kasutamist“ alapunktide „DESIRETT ja rinnanäärmevähk“ ja „DESIRETT ja tromboos“ all. Lisainformatsiooni saamiseks lugege palun seda lõiku ning vajadusel pidage koheselt nõu oma arstiga.

DESIRETT'i kasutamise ajal võib tekkida ebaregulaarne tupekaudne veritsus. See võib olla kerge määrimine, mille korral ei pruugi vaja olla isegi hügieenisidet, või tugevam verejooks, mis näeb pigem välja kui vähene menstruatsioon ja nõuab hügieenisideme kasutamist. Samuti võib teil veritsus üldse puududa. Ebaregulaarsed veritsused ei tähenda, et DESIRETT'i rasestumisvastane kaitse on vähenenud. Üldiselt pole vaja midagi ette võtta, jätkake lihtsalt DESIRETT'i võtmist. Kui siiski veritsus on tugev või pikaajaline, peaksite te pidama nõu oma arstiga.

- Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda 1 kuni 10 kasutajal 100-st): meeleolu muutused, masendunud meeleolu, suguiha (libiido) langus, peavalu, iiveldus, akne, rindade valulikkus, ebaregulaarsed veritsused või menstruatsiooni puudumine, kehakaalu suurenemine.
- Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda 1 kuni 10 kasutajal 1000-st): tupeinfektsioon, raskused kontaktläätsede kandmisel, oksendamine, juuste väljalangemine, valulik menstruatsioon, munasarja tsüst, väsimus.
- Harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st): nahalööve, nõgestõbi, valulikud sinakas-punased nahasõlmed (nodoosne erüteem). Need on nahanähud.

Lisaks nendele kõrvaltoimetele võib esineda eritist või leket rinnanäärmetest.

Pöörduge kohe oma arsti poole, kui teil ilmnevad angioödeemi sümptomid, nagu (i) näo-, keele- või kõriturse; (ii) neelamisraskused; või (iii) kublad ja hingamisraskused.

## **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas DESIRETT'i säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage DESIRETT'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“.  
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida DESIRETT sisaldab**

- Toimeaine on desogestrel. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mikrogrammi desogestreeli.
- Teised koostisosad on: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon, d-alfa-tokoferool, sojaõli, veevaba kolloidne ränidioksiid, hüdreeritud kolloidne ränidioksiid, steariinhape, hüpromelloos, makrogool, titaandioksiid (E171) (vt ka lõigus 2 „DESIRETT sisaldab laktoosi (piimasuhkur) ja sojaõli“).

#### **Kuidas DESIRETT välja näeb ja pakendi sisu**

Üks DESIRETT blisterpakend sisaldab 28 valget ümmargust õhukese polümeerikattega tabletti. Igas karbis on 1, 3, 6 või 13 blisterit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

#### **Müügiloa hoidja ja tootja**

##### Müügiloa hoidja

UAB Exeltis Baltics

Islandijos pl. 209A

Kaunas, LT-49163

Leedu

##### Tootja

Laboratorios León Farma, S.A.

Pol. Ind. Navatejera.

C/ La Vallina s/n

24008 - Navatejera, León.

Hispaania

**See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:**

Ühendkuningriik	Desogestrel 75 microgram film-coated tablets
Bulgaaria	Desirett
Tšehhi Vabariik	Velavel 0.075 mg
Eesti	DESIRETT
Saksamaa	Desirett 75 mcg
Ungari	Desirett 75 mcg
Leedu	DESIRETT 75 mikrogramai plèvele dengtos tabletės
Läti	DESIRETT 75 mikrogramí apvalkotās tabletes
Poola	Desirett
Rumeenia	Desirett 75 micrograme
Slovaki Vabariik	Desirett 75 microgramov
Sloveenia	Desirett 75 mikrogramov filmsko obložene tablete

**Infoleht on viimati uuendatud septembris 2020.**