

Pakendi infoleht: teave kasutajale
Water for injections Fresenius, süsteravimi lahusti
Süstevesi

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Järgmine teave on peamiselt tervishoiutöötajatele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Koostis

Süstevesi on steriilne apürogeenne vesi, mis on valmistatud destillatsiooni ja osmootse töötlemise teel.

Preparaat ei sisalda konservante ega antimikroobseid lisandeid.

Süstevee pH on 5,0...7,0.

Näidustused

Intravenoosselt või intramuskulaarselt manustatavate ravimite lahustamine ja lahjendamine. Irrigatsioon või loputuslahuste valmistamine.

Manustamisviis

Ravimi- ja loputuslahuseid, mille valmistamiseks on kasutatud steriilset süstevett, kasutatakse vastavalt lahuste koostises kasutatud ravimite või toimeainete kasutamisharjumuste ja kasutamisharjumuste toodud annustele ja kasutamisharjumustele.

Vastunäidustused, hoiatused ja kõrvaltoimed

Puhast süstevett ei tohi veeni manustada, kuna see võib esile kutsuda hemolüüsi (erütrotsütolüüsi).

Steriilse süstevee kasutamisel irrigatsiooniks tuleb meeles pidada asjaolu, et sattumisel üldisesse vereringesse võib ta põhjustada hemolüüsi (erütrotsütolüüsi).

Kui ravimi- ja loputuslahuseid valmistatakse vastavalt ettenähtud reeglitele ja eeskirjadele, kõrvaltoimeid ei teki.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.raviamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Säilitamine ja kõlblikkusaeg

Süstevesi polüetüleenpudelites ja polüpropüleenkotis:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Süstevesi KabiPac ja KabiClear pudelites:

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Mitte lasta külmuda.

Avatud pakend on aseptilistes tingimustes säilitatuna kasutamiskõlblik 12 tundi.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja möödumist.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pakend

250 ml või 500 ml polüetüleenpudelid; 250 ml, 500 ml või 1000 ml lahust EuroCap korgiga polüetüleenpudelid (KabiPac pudelid) (karbis on 1 x 250 ml, 20 x 250 ml, 1 x 500 ml, 20 x 500 ml, 1 x 1000 ml või 10 x 1000 ml); 1000 ml lahust polüpropüleenkotis; 100 ml, 250 ml, 500 ml või 1000 ml korgiga polüpropüleenpudelid (KabiClear pudelid) (karbis on 40 x 100 ml, 20 x 250 ml, 20 x 500 ml või 10 x 1000 ml).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Fresenius Kabi Polska Sp. zo.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poola

Tootja

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2016.