

Pakendi infoleht: teave kasutajale

## **OTIDOLO PEKANA**

Kõrvatilgad, lahus

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

### **Infolehe sisukord**

1. Mis preparaat on OTIDOLO PEKANA ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne OTIDOLO PEKANA kasutamist
3. Kuidas OTIDOLO PEKANA võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas OTIDOLO PEKANA säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

### **1.MIS RAVIM ON OTIDOLO PEKANA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

OTIDOLO PEKANA on homöopaatiline preparaat.

### **2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE OTIDOLO PEKANA KASUTAMIST**

**Ärge võtke OTIDOLO PEKANA**, kui te olete allergiline või ülitundlik OTIDOLO PEKANA mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

#### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga OTIDOLO PEKANA:**

Otidolo sisaldab väikeses koguses alkoholi (etanool), vähem kui 100 mg ühekordse annuse kohta (1-2 tilka). OTIDOLO PEKANA on ette nähtud ainult kõrvatilkadena kasutamiseks.

#### **Muud ravimid ja OTIDOLO PEKANA**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

#### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Viited ohule kasutamisel raseduse ja imetamise ajal puuduvad. Enne kasutamist konsulteerige arstiga.

#### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

OTIDOLO PEKANA kasutamine ei mõjuta autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

### **3.KUIDAS OTIDOLO PEKANA KASUTADA**

Võtke OTIDOLO PEKANA alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Teie arst ei ole teisiti määranud, on tavaline annus:  
1 tilk kõrva tilgutada mitu korda päevas ja sulgeda vatitükiga kõrv kinni.

Ravikuuri pikkus sõltub haigusseisundist. Kui sümptomid ei leevendu peale ühenädalast ravikuuri, pidage nõu arstiga.

Kui teil on tunne, et OTIDOLO PEKANA toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **Kasutamine lastel**

Puuduvad andmed kasutuse kohta alla ühe aasta vanustel lastel.

#### **Kui te võtate OTIDOLO PEKANA rohkem kui ette nähtud**

Üleannustamisest ei ole teavitatud.

#### **Kui te unustate OTIDOLO PEKANA võtta**

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

#### **Kui te lõpetate OTIDOLO PEKANA võtmise**

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib OTIDOLO PEKANA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

#### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5.KUIDAS OTIDOLO PEKANA SÄILITADA**

Hoida temperatuuril kuni 25° C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage OTIDOLO PEKANA pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist on 12 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **6.Pakendi sisu ja muu teave**

#### **Mida OTIDOLO PEKANA sisaldab**

Toimeained: 1 gramm lahust (1g – 0,88 ml – 20 tilka) sisaldab:

<i>Atropa belladonna spag. Peka</i>	Dil	D4	0.070g
<i>Chamomilla recutita</i>	Dil	D4	0.075g
<i>Echinacea spag. Peka</i>	Dil	D5	0.090g
<i>Phytolacca americana</i>	Dil	D4	0.065g
<i>Plantago major spag. Peka</i>	Dil	D6	0.085g
<i>Pulsatilla pratensis spag. Peka</i>	Dil	D4	0.035g

Abiained: glütserool, etanool, puhastatud vesi.  
Etanooli sisaldus 9 mahu%.

**Kuidas OTIDOLO PEKANA välja näeb ja pakendi sisu**

Värvitu, selge lahus kõrva tilgutamiseks.

III tüüpi pruun klaaspudel kartongkarbis, keeratava polüpropüleenist korgiga ja pipetiga.

Pakendis on 10 ml lahust.

Pappkarp, milles on klaaspudel 10 ml lahusega.

**Müügiloa hoidja ja tootja**

PEKANA® Naturheilmittel GmbH

Raiffeisenstrasse 15

D-88353 Kisslegg

Tel. +49 7563 91160

Faks. +49 7563 2862

E-mail: [info@pekana.com](mailto:info@pekana.com)

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

Tel. +372 6328 830

e-mail: [info@aconit.ee](mailto:info@aconit.ee)

**Infoleht on viimati uuendatud septembris 2020.**