

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Septolete omni, 1,5 mg/5 mg/ml suuõõnesprei, lahus bensüdamiinvesinikkloriid/tsetüülpüridiinkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Septolete omni ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Septolete omni kasutamist
3. Kuidas Septolete omni't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Septolete omni't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Septolete omni ja milleks seda kasutatakse

Septolete omni suuõõnesprei lahus on põletikuvastase, valuvaigistava ja antiseptilise toimega ravim paikseks suukaudseks kasutamiseks. Suuõõnesprei desinfitseerib suuõõnt ja neelu ning leevendab neelupõletiku nähtusid, nagu valu, punetus, paistetust, kuumamine ja häirunud funktsioon.

Septolete omni't kasutatakse põletikuvastaseks, valuvaigistavaks ja antiseptiliseks raviks:

- neelu, suuõõne ja igemete ärrituse korral,
- igeme- ja neelupõletiku korral ning
- enne ja pärast hamba eemaldamist.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Septolete omni kasutamist

Septolete omni't ei tohi kasutada

- kui olete bensüdamiinvesinikkloriidi, tsetüülpüridiinkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
- alla 6-aastastel lastel, kuna see ravimvorm ei ole selle vanusegrupi jaoks sobiv.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Septolete omni kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Septolete omni't kauem kui 7 päeva. Kui haigusnähud süvenevad või ei leevene 3 päeva möödudes, või kui tekivad muud haigusnähud, nt palavik, konsulteerige arstiga.

Paiksete preparaatide kasutamine, eriti pikema perioodi jooksul, võib kaasa tuua sensibiliseerumise ja sel juhul tuleb ravi katkestada.

Septolete omni't ei tohi kasutada kombineerituna anioonsete ühenditega, näiteks nendega, mis sisalduvad hambapastas. Seetõttu ei soovitata preparaati kasutada vahetult enne või pärast hammaste

pesemist.

Septolete omni suuõõnesprei lahusega tuleb vältida otsest kontakti silmadega. Ravimit ei tohi sisse hingata.

Lapsed ja noorukid

Septolete omni't ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel, kuna suuõõnesprei ei ole selle vanusegrupi jaoks sobiv.

Muud ravimid ja Septolete omni

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Septolete omni't samaaegselt koos teiste antiseptikutega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Septolete omni't ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal.

Te peate arutama oma arstiga, kes otsustab, kas lõpetada rinnaga toitmine või peatada ravi Septolete omni'ga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Septolete omni ei mõjuta autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

Septolete omni sisaldab etanooli, makrogoolglütseroolhüdrosüstearaati ja naatriumi

Ravim sisaldab 267,60 mg alkoholi (etanool) 1 ml suuõõnesprei lahuses. Alkoholi sisaldus selle ravimi 1 ml annuses on väiksem kui 7 ml-s õlles või 3 ml-s veinis.

Väike kogus alkoholi selles ravimis ei oma märkimisväärset toimet.

Makrogoolglütseroolhüdrosüstearaat võib põhjustada maoärritust ja kõhulahtisust.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt "naatriumivaba".

3. Kuidas Septolete omni't kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Ühekordse annuse manustamiseks tuleb pihustit vajutada **üks kuni kaks korda**. Seda võib korrata iga 2 tunni järel, 3...5 korda päevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Noorukid vanuses üle 12 aasta

Ühekordse annuse manustamiseks tuleb pihustit vajutada **üks kuni kaks korda**. Seda võib korrata iga 2 tunni järel, 3...5 korda päevas.

Lapsed vanuses 6 kuni 12 aastat

Ühekordse annuse manustamiseks tuleb pihustit vajutada **üks kord**. Seda võib korrata iga 2 tunni järel, 3...5 korda päevas.

Septolete omni't ei tohi kasutada alla 6 aasta vanustel lastel.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Optimaalse toime saavutamiseks ei ole soovitatav preparaati kasutada vahetult enne või pärast hambapesu.

Kasutamisyjuhend

Enne Septolete omni suuõõnesprei esmakordset kasutamist vajutage pihustit mitu korda, et saavutada ühtlane juga. Juhul, kui pihustit ei ole pikka aega kasutatud (nt vähemalt 1 nädal), vajutage pihustit üks kord, et saavutada ühtlane juga.



Enne kasutamist eemaldage plastikkork.



Avage oma suu, suunake pihusti otsik neelu poole ja vajutage pihustipead 1...2 korda. Pihustamise ajal hoidke hinge kinni.

Kui pihustit vajutada üks kord, väljub 0,1 ml suuõõnesprei lahust, mis sisaldab 0,15 mg bensüüdamiinvesinikkloriidi ja 0,5 mg tsetüülpiridiinkloriidi.

Ravi kestus

Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 7 päeva. Kui haigusnähud süvenevad või ei leevene 3 päeva möödudes, või kui tekivad muud haigusnähud, nt palavik, konsulteerige arstiga. Rääkige oma arstiga, kui probleem kordub või kui märkate haigusnähtudes mingeid hiljutisi muutusi.

Kui te kasutate Septolete omni't rohkem, kui ette nähtud

Ettenähtust suurema annuse juhuslikul alla neelamisel võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga ja küsige nõu.

Kui te unustate Septolete omni't kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

- nõgestõbi (urtikaaria), naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes (valgustundlikkus),
- järsk, kontrollimatu hingamisteede ahenemine (bronhospasm).

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):

- suuõõne paikne ärritus, põletustunne suuõõnes.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- allergiline reaktsioon (ülitundlikkus): tõsine allergiline reaktsioon (anafülaktiline šokk), mille sümptomid võivad olla hingamisraskus, valu või rõhumine rindkeres, ja/või pearinglus/nõrkus, tugev naha sügelus või lööbe teke nahal, näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik,

- põletav tunne suu limaskestal, suu limaskesta tundetus (anesteesia).

Tavaliselt on need kõrvaltoimed mööduvad. Kui need siiski ilmnevad, on soovitatav rääkida oma arsti või apteekriga.

Järgides juhiseid patsiendi infolehes, vähendate kõrvaltoimete tekkimise riski.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Septolete omni't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pärast pakendi esmakordset avamist võib preparaati kasutada 12 kuu jooksul hoides temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Septolete omni sisaldab

- Toimeained on bensüdamiinvesinikkloriid ja tsetüülpüridiinkloriid.
Üks ml suuõõnesprei lahust sisaldab 1,5 mg bensüdamiinvesinikkloriidi ja 5 mg tsetüülpüridiinkloriidi.
Üks pihustus sisaldab 0,1 ml suuõõnesprei lahust, milles on 0,15 mg bensüdamiinvesinikkloriidi ja 0,5 mg tsetüülpüridiinkloriidi.
- Teised koostisosad on etanool (96%), glütserool (E422), makrogoolglütseroolhüdrosüstearaat, naatriumsahhariin (E954), piparmündiõli, puhastatud vesi. Vt lõik 2 "Septolete omni sisaldab etanooli, makrogoolglütseroolhüdrosüstearaati ja naatriumi".

Kuidas Septolete omni välja näeb ja pakendi sisu

Suuõõnesprei lahus on selge, värvitu kuni kollakas vedelik.

Septolete omni on saadaval 30 ml suuõõnesprei lahust sisaldavas plastikust pudelis koos mõõtepumba ja korgiga, pakendatud karpi. 30 ml suuõõnesprei lahust jagub 250 pihustuseks.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn

Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2021.