

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Recreol 50 mg/g salv** dekspantenool (*Dexpanthenolum*)

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Recreol ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Recreol'i kasutamist
3. Kuidas Recreol'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Recreol'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Recreol ja milleks seda kasutatakse**

Recreol salv sisaldab toimeainet dekspantenooli, mis kuulub haavade ja haavandite raviks ette nähtud preparaaside rühma. Dekspantenool muutub kudedes pantoteenhappeks. Pantoteenhape taastab naha elastsuse ja soodustab haava paranemist.

Recreol salvi kasutatakse:

Pindmiste nahakahjustuste toetav ravi. See aitab niisutada naha välimist kihti ja soodustab paranemist koos põletikuvastase ja sügelusvastase toimega.

Recreol salvi võib kasutada lastel, noorukitel ja täiskasvanutel.

#### **2. Mida on vaja teada enne Recreol'i kasutamist**

##### **Recreol salvi ei tohi kasutada**

- kui olete dekspantenooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- haavadel, kui teil on hemofiilia, suure verejooksu riski tõttu.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Allergilise reaktsiooni esinemisel tuleb Recreol salvi kasutamine lõpetada.

Recreol salvi sattumist silma tuleb vältida.

Anogenitaalses piirkonnas kasutamise korral võib Recreol salv mõjutada kondoomide tugevust.

##### *Recreol'i kasutamisel on vajalik eriline ettevaatus*

Recreol'i kasutamise ajal ärge suitsetage ega viibige lahtise tule läheduses, sest esineb tõsise põletuse oht. Ravimiga kokku puutunud kangad (riided, voodipesu, sidemed jms) süttivad kergemini ja see kujutab endast tõsist tulekahjuohtu. Riiete ja voodipesu pesemisel ravimi kogus väheneb, kuid pesu ei eemalda seda täielikult.

### **Muud ravimid ja Recreol**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Puuduvad tõendid, et Recreol salvil esineksid koostoimed ükskõik milliste teiste ravimitega.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Recreol salvi võib raseduse ja imetamise ajal kasutada ainult teie arsti soovitusel.

Tuleb hoiduda paiksest manustamisest rindadele, et vältida imiku suukaudset kokkupuudet.

Uuringuid toime kohta inimese viljakusele ei ole dekspantenooliga läbi viidud.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Recreol salv ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

### **Recreol salv sisaldab tsetüülalkoholi, steariüülalkoholi ja villarasva**

Tsetüülalkohol, steariüülalkohol ja villarasv võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

## **3. Kuidas Recreol'i kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamiseks nahal.

Kui ei ole määratud teisiti, tuleb täiskasvanutel ja lastel manustada õhukene kiht salvi kahjustatud nahale vastavalt vajadusele üks või mitu korda ööpäevas.

Ravi kestus sõltub haiguse iseloomust ja kulust. Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

### **Kasutamine lastel**

Recreol salvi võib lastel kasutada.

Kui teil on tunne, et Recreol salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

*Väga harv (võib esineda kuni ühel inimesel 10 000-st):* allergilised reaktsioonid, ülitundlikkusreaktsioonid (nt nahapõletik/allergilised ja ärritavad nahareaktsioonid).

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Recreol'i säilitada**

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pappkarbil pärast „EXP:“.  
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## 6. Pakendi sisu ja muu teave

### Mida **Recreol** salv sisaldab

- Toimeaine on dekspantenool. 1 g salvi sisaldab 50 mg dekspantenooli.
- Teised koostisosad on steariülalkohol, tsetüülalkohol, valge mesilasvaha, Protegin XN (*Paraffinum liquidum*, petrolaatum, osokeriit, glütseriüloleaat, lanoliinalkohol), rafineeritud mandliõli, valge vaseliin, vedel parafiin, villarasv, puhastatud vesi.

### Kuidas **Recreol** välja näeb ja pakendi sisu

Homogeenne kollakas spetsiifilise lõhnaga salv.

30 g või 50 g salvi alumiiniumtuubis. Tuub on suletud alumiiniummembraaniga ja valge keeratava korgiga. Alumiiniumtuub on pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

### Müügiloa hoidja ja tootja

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV1057,

Läti

Tel: +371 6708 3205

Faks: +371 67083505

E-post: grindeks@grindeks.lv

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal

Tondi 33, 11316 Tallinn

Tel. +372 6120224

### See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti	RECREOL
Läti	RECREOL 50 mg/g ziede
Leedu	RECREOL 50 mg/g tepalas
Tšehhi	RECREOL
Slovakkia	RECREOL 50 mg/g mast'
Ungari	RECREOL 50 mg/g kenőcs
Soome	Recreol 50 mg/g voide
Poola	Recreol
Rumeenia	Recreol 50 mg/g unguent
Portugal	Recreol 50 mg/g pomada
Sloveenia	Recreol 50 mg/g mazilo
Austria	Recreol 50 mg/g Salbe
Saksamaa	Dexpanthenol Grindeks 50 mg/g Salbe

**Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2022.**