

## Pakendi infoleht: teave kasutajale

### Lescol XL, 80 mg toimeainet prolungeeritult vabastavad tabletid fluvastatiin

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Lescol XL ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Lescol XLi võtmist
3. Kuidas Lescol XLi võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Lescol XLi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### 1. Mis ravim on Lescol XL ja milleks seda kasutatakse

Lescol XL sisaldab toimeainet fluvastatiinnaatrium, mis kuulub statiinideks nimetatud ravimite rühma ning langetab rasvade (lipiidid) sisaldust teie veres. Neid kasutatakse patsientidel, kellel ainult dieedi ja kehalise koormusega ei ole saavutatud soovitud tulemust.

- Lescol XL on ravim, mida **kasutatakse täiskasvanutel rasvade kõrgenenud taseme langetamiseks veres**, eriti üldkolesterooli ja niinimetatud „halva“ ehk LDL-kolesterooli, mis on seotud suurenenud riskiga südamehaiguse ja insuldi tekkeks
  - täiskasvanud patsientidel, kellel veres on kõrge kolesteroolitase,
  - täiskasvanud patsientidel, kellel veres on kõrge nii kolesterooli kui triglütseriidide (teist tüüpi vererasvad) tase.
- Arst võib teile määrata ravi Lescol XLiga ka selleks, et ära hoida edasisi tõsiseid kardiaalseid (südamega seotud) tüsistusi (nt südamelihaseinfarkt), kui te olete patsient, kellele on juba tehtud südame kateteriseerimine ehk uuring südame veresoone kaudu.

Kui teil on küsimusi, kuidas Lescol XL toimib või miks see ravim on teile määratud, pöörduge oma arsti poole.

#### 2. Mida on vaja teada enne Lescol XLi võtmist

Järgige arsti poolt antud kõiki juhiseid tähelepanelikult, isegi siis, kui need erinevad selles infolehes esitatud teabest.

Enne Lescol XLi võtmist lugege järgnevaid selgitusi.

#### Lescol XLi ei tohi võtta

- kui olete fluvastatiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil esineb praegu probleeme maksaga või teil on ebaselge põhjusega püsivalt kõrge teatud maksaensüümide (transaminaasid) aktiivsus;
- kui te olete rase või toidate last rinnaga (vt lõik “Rasedus ja imetamine”).

Kui midagi nendest kehtib teie kohta, siis ärge Lescol XLi võtke ja pidage nõu oma arstiga.

#### Hoiatused ja ettevaatusabinõud



**võtma hakata. Lescol XLi võtmine koos fusidiinhappegaga võib harvadel juhtudel põhjustada lihaste nõrkust, hellust või valu (rabdomüolüüs). Vt lisateavet rabdomüolüüsi kohta lõigust 4.**

Lescol XLi võib võtta üksinda või koos teiste, arsti poolt määratud, kolesterooli taset langetavate ravimitega.

Pärast resiini, näiteks kolestüramiini (kasutatakse eelkõige kõrge kolesteroolitaseme raviks) manustamist oodake vähemalt 4 tundi enne, kui võtate Lescol XLi.

Teavitage oma arsti või apteekrit järgmiste ravimite võtmisest:

- tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse immuunsüsteemi pärssimiseks);
- fibraadid (nt gemfibrosiil), nikotiinhape või sapphapete sekvestrandid (ravimid, mida kasutatakse „halva“ kolesterooli taseme langetamiseks);
- flukonasool (ravim, mida kasutatakse seennakkuste raviks);
- rifampitsiin (antibiootikum);
- fenütoiin (epilepsia ravim);
- suukaudsed antikoagulandid, nagu varfariin (verehüübimist vähendavad ravimid);
- glibenklamiid (diabeedi ravim);
- kolhitsiin (podagra ravim).

### **Rasedus ja imetamine**

Ärge võtke Lescol XLi, kui olete rase või toidate last rinnaga, sest toimeaine võib kahjustada teie veel sündimata last ning ei ole teada, kas toimeaine eritub inimese rinnapiima.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage Lescol XLi võtmise ajal usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui rasestute selle ravimi võtmise ajal, lõpetage Lescol XLi võtmine ja pöörduge oma arsti poole. Arst selgitab teile Lescol XLi võtmise riske raseduse ajal.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Lescol XLi toime kohta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele puuduvad andmed.

## **3. Kuidas Lescol XLi võtta**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ärge ületage soovitatavat annust.

Arst soovib teil järgida madala kolesteroolisisaldusega dieeti. Jätkake seda dieeti Lescol XLi võtmise ajal.

### **Kui palju Lescol XLi võtta**

#### **Soovitatavad annused täiskasvanutele**

Täiskasvanutele soovitatav fluvastatiini annusevahemik on 20...80 mg ööpäevas sõltuvalt sellest, milline kolesteroolitaseme langus on vaja saavutada. Arst võib teil annust kohandada 4-nädalaste või pikemate intervallide tagant.

#### **Kasutamine lastel ja noorukitel**

Lastel (9 aastased ja vanemad) on tavaline algannus 20 mg fluvastatiini ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 80 mg. Arst võib annust kohandada 6-nädalaste intervallide tagant.

Teie arst ütleb teile täpselt, kui palju fluvastatiini võtta.

Sõltuvalt teie ravivastusest võib arst annust suurendada või vähendada.

### **Millal tuleb Lescol XLi võtta**

Kui võtate Lescol XLi tablette, võite annuse manustada ükskõik millisel kellaajal. Lescol XLi võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake tablett tervelt alla koos klaasitäie veega.

### **Kui te võtate Lescol XLi rohkem, kui ette nähtud**

Kui te olete juhuslikult võtnud liiga palju Lescol XLi tablette, rääkige sellest kohe oma arstile. Te võite vajada arstiabi.

### **Kui te unustate Lescol XLi võtta**

Võtke unustatud annus kohe, kui see teile meenub. Sellegi poolest, ärge võtke unustatud annust juhul, kui järgmise annuse võtmiseni on jäänud vähem kui 4 tundi. Sellisel juhul võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

### **Kui te lõpetate Lescol XLi võtmise**

Et säilitada ravist saadav kasu, ärge lõpetage Lescol XLi võtmist enne, kui arst seda teile ütleb. Te peate jätkama Lescol XLi võtmist vastavalt juhiste, et hoida „halva“ kolesterooli tase madal. Lescol XL ei ravi teid terveks, kuid aitab haigust kontrolli all hoida. Ravi ajal tuleb regulaarselt kontrollida kolesteroolitaset.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned harva (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st) või väga harva (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st) esinevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised: pöörduge otsekohe arsti poole.

- kui teil esineb seletamatu lihasvalu, lihaskrambid või lihaskõrge. Need võivad olla võimaliku raske lihaste kõhetumise varajased tunnused. Seda saab vältida, kui arst lõpetab teie ravi fluvastatiiniga nii kiiresti kui võimalik. Selliseid kõrvaltoimeid on esinenud ka teistel samasse ravimiklassi kuuluvatel ravimitel (statiinid);
- kui teil esineb ebataoline väsimus või palavik, silmade ja naha kollasus, tume uriin (maksapõletiku tunnused);
- kui teil esinevad nahareaktsioonid, nagu nahalööve, nõgestõbi, punetus, sügelus; näo, silmalauade ja huulte turse;
- kui teil on nahaturse, hingamisraskused, pearinglus (raske allergilise reaktsiooni tunnused);
- kui teil esineb tavalisest kergemini verejookse või verevalumeid (vereliistakute arvu vähenemise tunnused);
- kui teil on punased või lillakad nahakahjustused (veresoonte põletiku tunnused);
- kui teil esineb punaselaiguline lööve, peamiselt näol, millega võib kaasneda väsimus, palavik, iiveldus, söögiisu kadumine (*lupus erythematosus*'e sarnase reaktsiooni tunnused);
- kui teil on äge ülakõhu valu (kõhunäärme põletiku tunnused).

Kui teil esineb mõni nimetatud kõrvalnähtudest, rääkige sellest kohe oma arstile.

Teised kõrvaltoimed: öelge oma arstile, kui need teile muret teevad.

*Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):*

- unehäired, peavalu, ebamugavustunne maos, kõhuvalu, iiveldus, lihas- ja maksaanalüüside kõrvalekaldeid veres.

*Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):*

- surin või tuimus kätes või jalgades, tundlikkushäired või tundlikkuse vähenemine.

*Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):*

- impotentsus, püsiv lihaskõrge, hingamisprobleemid, kaasa arvatud püsiv kõha ja/või õhupuudus või palavik;
- kõhulahtisus.

### Muud võimalikud kõrvaltoimed

- unehäired, kaasa arvatud unetus ja hirmuunenäod;
- mälukaotus;
- seksuaalfunktsiooni häired;
- depressioon;
- diabeet. See on tõenäolisem, kui teil on kõrge suhkru või rasvade tase veres, olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk. Teie arst võib teid jälgida, kui te seda ravimit võtate;
- kõõlusepõletik, turse ja ärritus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Lescol XLi säilitada**

- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
- Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
- Ärge kasutage seda ravimit, kui pakend on kahjustatud või avatud.
- Kuni kasutamiseni hoidke Lescol XL tabletid blistris, et kaitsta neid niiskuse eest.
- Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Lescol XL sisaldab**

- Toimeaine on fluvastatiinnaatrium.  
Iga Lescol XL 80 mg tablett sisaldab 84,24 mg fluvastatiinnaatriumi, mis vastab 80 mg vabale fluvastatiinhappele.
- Teised koostisosad on: mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, hüdroksüpropüülselluloos, kaaliumvesinikkarbonaat, povidoon, magneesiumstearaat, makrogool 8000, kollane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171).

### **Kuidas Lescol XL välja näeb ja pakendi sisu**

Lescol XL 80 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on kollased ümmargused kergelt kumerate külgedega kaldservadega tabletid. Ühel küljel on märgistus "LE" ja teisel küljel "NVR".

- *Pudelid:* Pakendis on 28, 30, 50, 98 või 100 (2 x 50 või 1 x 100) ja haiglapakendis 300 (15 x 20) või 600 (30 x 20) toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.
- *Blistrid:* Pakendis on 7, 14, 28 (4 x 7 või 2 x 14), 28 (üheannuselises perforeeritud blisterpakendis), 30, 42, 49 (7 x 7), 56 (8 x 7), 70, 84, 90 või 98 (14 x 7 või 7 x 14) ja haiglapakendis 28, 56, 98 või 490 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

#### Teisese müügiloa hoidja:

First Pharma OÜ  
Härgmäe 22  
13525 Tallinn  
Eesti

Tel: +372 6441122  
e-post: info@firstpharma.ee

Tootja:  
Novartis Pharma GmbH  
Roonstrasse 25  
D-90429 Nürnberg  
Saksamaa

Ümberpakendaja:  
GPE Globalpharma OÜ  
Tiigi 61b  
50410 Tartu  
Eesti

**Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun teisese müügiloa hoidja poole.**

**See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:**

<u>Liikmesriigi nimi</u>	<u>Ravimi nimetus</u>
Eesti, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Läti, Leedu, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Ühendkuningriik	Lescol XL
Taani, Soome, Island, Norra, Rootsi	Lescol Depot
Saksamaa	Fluvastatin Novartis
Austria	Lescol MR
Belgia, Luksemburg	Lescol Exel
Prantsusmaa	Lescol LP
Saksamaa	Locol
Itaalia	Lescol, Lipaxan
Portugal	Canef
Hispaania	Lescol Prolib, Liposit Prolib, Vaditon Prolib, Digaril Prolib

**Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2022.**